

QVÆSTIO MEDICA

Quodlibetariis disputationibus manè discutienda in Scholis Medicorum die Jovis 10. Februarij

M. MATTHÆO THVILLIER, Doctore Medico, Præfide.

An incipiente Parotide sanguis à proxima inguli vena mittendus.

Quidquid in morbis recte fit, & apparet ad salutem, id, nisi cæco interveniat casu, artis aut naturæ beneficium est. Cæsa rara felicitas; arti sæpe non respondet, artificem sæpius fallit eventus. Equabilior & minus dubia, sed non omnino certa, nec semper prospera naturæ molitio. Opus inceptum aliquando non perficit, nec partes adimplet suas: quinetiam intemptivo conatu noxam sibi quandoque constat & ruinam. Hinc Crisæon (que subitè sunt illius in ægris motus) non eadem parque bonitas, nec una differentia. Morbum alia penitus solvit, aut eximit; augeat alia, vel cum morte commutat. Omnes excretionem sunt, vel abscissu; morbis acutis excretio longis familiarior abscissus. In hoc perfectam crîsim querere, miserabilis est rerum ignorantia. Naturæ votis nullus usquam scit satis, ne laudabilis quidem, ejus debilitatem, aut excrementorum contumaciam, aut viarum impedimentum te- statur, ipsiusque morbi materiam aliò tantum transfert, ac prioris saltem est mali in aliam speciem partemque transiit & convertio. Sed ut omnibus alijs in rebus, sic in abscissibus difficilis & ardua est optimi perfectio; eorum quibus absoluitur, raro non aliquid deest; hic temporis, ille humoris vitio infamis; quidam angustioribus coarctetur sanguis, morboque impar ejus foci funditus non exhaurit; alius principi membro vicinior, excursus, recursum injicit metum, & nisi maturè provideatur, sæpe est ad interitum fatalis.

II.

Varijs nominibus male is audit, quem ductà ab obfessis partibus appellatione Parotidem vocant. Nec te fallat exterior illius situs, nec glandularum quibus peculiariter insidet, vilior conditio. Plerique abscissibus internis pravitate non cedit; nullus ferme cerebro insidiatur magis, ac superfluos humores quæ viarum opportunitate pars illa princeps expellit in subiectas glandulas, eadem hæ acceptam injuriam quasi ulturæ, sæpe in cerebro repellunt. Diffusâ etiam mox in laryngem, mox in thoracem materiâ intercludit animæ vias. In morbis diuturnis hic finem ut plurimum emittit, inter initia erumpit in acutis. In his irritatæ præcox & temeraria; in illis oppresse naturæ languidior atque imbellis fere contentio; in alijs crassæ & perviæciæ materiæ; in alijs internæ malignitatis insinuatum germinem; in omnibus periculum ni augeat, præfens certe aperit, aut futurum minatur. Cometæ instat, impune nunquam, vel sine formidinis cunctis. Parva parotis, prava, nec conferte; major horrenda, nec fere potest. Quos vel leuæque, vel parælexia, vel graveolentis ilei calamitas, fatidarumve dejectionum multa varietas cum acuta febre & hy- pochondrij tensione conjuncta, vel graviore pulmonis affectus consistant, per *Epistemon* frequenter occidit. Si quis vero critica motione affligatur, quæ spes ex secretionem tantuli humoris; Sed & cum morbum, successu admo- dum raro, remouet, quanti hæc solutio miseris ægotantibus constat? ipso morbo sæpe intolerabilior est, quandoque etiam principiorum: cum dolore attollitur & increfcit, vix digeritur in halitum, ægre concoquitur & suppurat. Suppuratæ interdum succedunt ulcera *Stomatocorum*, ossium caries, importuna fistula, aut fedæ cicatrice. Inchoat diarrhæa, petrihæa, pyelysmi, vel hæmorrhagiæ desiderio, aliâ induratur in scirrhum, aut desinit in ulcus mali moris; alias formidoloso erysipelate faciem infestat atque urit; sæpius intro refusa & deorsum relidens, delirium, convulsionem, apoplexiam inducit, ut quæcumque in morbum cadat Parotis, hæc illi plerumque quasi cumulus accedat: vel si melioribus oriatur auspicijs, quod usu non adeo venit, imperfecta saltem & laboriosa fit crîsis; utrovis in casu, sus est quamprimum adhibenda curatio.

III.

Tempus & oleum perdit, qui totus est in emollientibus remedijs; levioris sunt ea momenti & tardioris effectus; parum etiam remittant, & aliquanto explicatorem reddant, ejus tamen angustias nunquam ita expandunt, & atrocitas doloris? Cucurbitularum suspectus & anceps ulus, nisi igne & ferro securitatem præstet. Sed durum & quæle subsidium quantum periculi detrahit, tantum adjicit molestiæ & laboris. Purgantia quæ opportunis esse potest? at quo fare illud poterit? & morbis famulos præco symptomaticæ & morbi imperio ad aures altant? Sed qui tunc purgat, præcipuus artis infringit leges, frustra irritat & lacessit, corpus inflammatur, humores fundit, co- rumque imperum revocat ad principes & internas partes, ac temeritatem nisi fortuna adjuvet, fere plerumque excipit penitentia. An potius purgandi occasio, ubi criticum in modum, & cocto utcumque morbo natura Parotidem fundit? at quo illa vergit, consimili studio nitendum, eidem viæ & evacuationi insistentum. Præterea si leve medicamentum sit, quamvis primam corporis regionem ceu mollioribus everrat scopis, antecedentem Parotidis cau- sam, altiori sæpius conclusam loco, non attingit, nedum conjunctam. Si contra valentius, è parte affectâ nihil plus tædit, quam reforum sit à valis, totique deinceps sanguini temixtum, qui propterea labem suam aspergit, & è quo postea emulgeri hand facile potest: febris interim & symptomatum violentia redintegatur, & crîsis, quæcumque sit, fructus perit. Emeticorum ceu periculiosior quam catharticoz abusus, quo stomachum concutiunt ve- hementius, vim cerebro majorem inferunt, atque, cum illud, tum glandulas auribus circumfusâs novo potius gurgite onte, quam antiquo levate.

III.

His vitis atque approbiis vacat, quæ nascente Parotide fit sanguinis missio, nec lenta, nec acerbæ, nec plena speciali, maxime cum affines & cõterninæ venæ referantur; Hic enim, si usquam, habendus est illarum secundarum delectus. Quæ ad mallocoles excurrunt, auxilij sunt & signioris & imbecilli. Propinquiori gaudent situ quæ tunc in brachijs consuevere, sed necdum satis, nec unquam nisi crebrâ & sæpius repetitâ sectione, ac magnâ san- guinis viriuntque jactu rumentes abscissi partes complantant. Ranularum ut major cum Parotide vicinitas, ita & vilius divitio, nisi illarum exitus obstat. Omnium maxime amplitudine & propinquitate commendantur, quæ collum extrinsecus hinc inde perreperant. Earum hoc sæculo quamquam ad plerique cerebri affectus non infrequenter est incipit in hominibus incisio, nulli ramen quàm Parotidi accommodatior. Quos ille findantur in furculis, quo hic pertrahant, cuique sint usui, diligentius attende. Cutem inter & membranam, quam carnosam appellant, adnata per cervicis latera exportectæ in duos dirimantur ramos, qui numerosâ deinde fobole, intro quidem in laryn- gis, ossis hyoidis, & linguae mûculos, foras verò in omnem fere faciem, auriumque posticâs glandulas & partes ditioni quæ dissipantur. Ex istis totidem ceu rivulis uterque externarum jugularium major alveus sanguinem excipit, quem si non cordi tantum ex narute lege continuo transmittat, sed extra quoque per acceptum paracephalicum jugularium truscum confluxu, ipse etiam extremæ omnium propagines, ut suæ succurrant penuriæ, & vecturæ non desint, aliæ ex interni jugularium venarum truncis furculis, quibuscum communicant, sanguinem quæ rapiunt & quâdam continuatione, deoneratis prius cerebri sinibus & valis, quod in tumoris augmentum illabatur illapsumque est, avertunt: aliæ quod aurium glandulis, è quibus emergunt, impactum jam hæret, proximæ hauriunt & in se se corrivante, quæ exin ampliore in canalem cruoris commeatu una omnes transfundunt, viâ demum obviâ & perbrevis foras effluxurum.

V.

Hocce præsidio præfentius & facilius nullum, præsto est & in manu uno stat idcu, quem quisvis in re chirurgiâ pro & rudis apè indiget. Fietienda vena ampla est, & cute vix recta, appresso tantum digito, vel circumducto molli- ter linteo sic intumescent, ut alibi nulla secetur expeditus, ne in brachio quidem, nulla secutus, cum illi nec nervus aut tendo, nec arteria subjiciantur vel adjacent quæ scalpelli acie violari possint, ipse que etiam sanguis, mutato unquam sine discrimine; in illo sanguinis impetu, oppellio nonnunquam cerebro, succussionem affert gravioris mali. Rarior ex tuncularum crebritate pyelysmus, & uni forsan Hippocratici semel aut iterum observatus; pulmonis im- plicatos viarum meandros & anfractus suppetere prius debet, tot intermedias in partes incurrit defluens humor, ut quo ab illâ impellitur, aliquando non appellat. Suppurationem præterquam quod nonnunquam respuit parotidis in- amutæ simile. Adde quod etiam *absoluta*, levitate, exquisito candore blanditur, nequid tamen omnis est exempta suspicio, nisi universitatis excrementa suo etiam pepsimo fruantur. Sed ejusmodi naturæ motus & crîses inci- dentis pendens pariter agat, tot inter nos effluet rei certius ac tutius gerende occasio. Accipiet itaque coctiois & crîsis tempus, vicinam colli venam confestim aperiat: crîsim, si futura est, hac arte vel juvabit, vel ante occu- patam minori perturbatione faciet solus: Si nungquam futura, eam certa & nunquam præmatra sanguinis extractione suppellebit, inflammatarum partium æstum illico exstinguet, tensionem relaxabit, augecentem molem deprimet, molestias cum parotidis foro, incremento & suppuratione conjunctas prætercet, creditatis & palidiores confectionibus occurret, verbo dicam, Abscissum qui ob glandularum angustias *quâvis* est & inferior morbo, huic parem & *stripsimus* reddet: vel, quod longe præstabilis fuerit, materiam illi omnino nullam relinquet.

Ergo incipiente Parotide sanguis à proxima inguli vena mittendus.

DOMINI DOCTORES DISPUTATVRI

M. Guido Crescentius Fagon familia Regina Medicus.
M. Jacobus de Bourges.
M. Petrus Legier.

M. Franciscus Serand.
M. Nicolaus Rainsant.
M. Petrus Fourquet.

M. Berinus Dienziwoie.
M. Stephannus Bachot Scholæ Professor.
M. Ioannes Baptista Moreau Professor Regius.

Proponēbat Parisiis LVDOVICVS LABBÉ Claromontanus Bellovacensis. A. R. S. H. M. DC. LXXXVIII.